

कांदा रोप-वाटिका व्यवस्थापन

साधारण ५ ते ६ गुंठे जमिनीसाठी किंवा ४ ते ५ किलो बियाण्यासाठी
खालील डोसेस वापरावीत



● गादीवाफ्यावर टाकावयाचा बेसल डोस

ओरिजीनो - २ बॅग

+ सुपर फॉस्फेट - १२ ते १५ किलो

+ रूटांझा - १ किलो + ट्रायकोडर्मा - २५० ग्रॅम

टिप : रूटांझा व ट्रायकोडर्मा हे ओरिजीनो ह्या सेंद्रिय खतात मिक्स करावे व नंतर इतर खतांमध्ये टाकावे.

● बिज प्रक्रिया (उगवण क्षमता वाढवण्यासाठी व मर रोगांपासून वाचवण्यासाठी)

गरजेनुसार केमिकल बुरशीनाशक - प्रमाणानुसार

कॅन्सर्ट-ग्रिन - १० मिली प्रति १ किलो बियाण्यासाठी

टिप : सुरवातीला केमिकल बुरशीनाशकाची बिज प्रक्रिया करावी व नंतर अर्ध्या तासाने

कॅन्सर्ट-ग्रिन ची बिज प्रक्रिया करून पेरणी करावी

● बियाणे टाकल्यानंतर ३ ते ५ दिवसांमध्ये (अंबवनीचे पाणी देत असतांना जमिनीतील बुरशीसाठी प्रतिबंधक उपाय)

स्प्रिंकलरद्वारे / ड्रिपद्वारे / पाटपाण्याद्वारे / गच्चफवारणीद्वारे / झारीच्या साह्याने व्यवस्थापन

कॅन्सर्ट - २५० मिली + ट्रायकोडर्मा - २५० ग्रॅम + प्रोबियोन - २५० मिली

● बियाणे टाकल्यानंतर ८ ते १० दिवसांमध्ये (उगवल्यानंतर पिवळे पडून मर-रोग येऊ नये म्हणून)

स्प्रिंकलरद्वारे / ड्रिपद्वारे / पाटपाण्याद्वारे / गच्चफवारणीद्वारे / झारीच्या साह्याने व्यवस्थापन

संचार-४० - २५० मिली + अंतरप्रवाही बुरशीनाशक - प्रमाणानुसार + लिओनार - २५० ग्रॅम

● बियाणे टाकल्यानंतर १२ ते १५ दिवसांमध्ये (उगवल्यानंतर पिवळे पडून मर-रोग येऊ नये म्हणून)

फवारणीद्वारे व्यवस्थान (प्रति १५ लिटर पाणी) टिप : फवारणी गच्च घ्यावी

एक्सीड - ३० ग्रॅम + वातावरणानुसार बुरशीनाशक - प्रमाणानुसार + मॅग्नेशियम सल्फेट - ३० ग्रॅम

+ ऑरसिल - ५ मिली

● बियाणे टाकल्यानंतर २२ ते २५ दिवसांमध्ये (तण नाशकानंतर)

१५:१५:१५ - १० किलो + मिंगल - ५०० ग्रॅम + थायोग्रिन - ५०० ग्रॅम

+ गरजेनुसार बुरशीनाशक - प्रमाणानुसार

टिप : वरिल खते मिक्स करून फोकुण द्यावे व त्वरित पाणी द्यावे.

● बियाणे टाकल्यानंतर २५ ते ३० दिवसांनी (प्रति १५ लिटर पाणी)

के२-व्हायब्रंट - १५ ग्रॅम

+ वातावरणानुसार बुरशीनाशक / किटकनाशक - प्रमाणानुसार

+ इनफ्युज - १० मिली

टिप : कोलेटोट्रायकम बुरशी येऊ नये म्हणून प्रतिबंधक फवारणी, जीकी सध्याची मुख्य समस्या आहे. (रोप जास्त वाढून शेंडा वाकडा होऊन पिवळे पडणे)



कोलेटोट्रायकम बुरशी

● महत्वाचे मुद्दे :

- १) उत्तम पाण्याचा निचरा होणारीच जमिन निवडावी
 - २) सेंद्रिय खतांचा तसेच निबोळी पेंटचा वापर करावा
 - ३) जैविक बुरशीनाशकांचा वापर करावा
 - ४) उत्तम प्रतिचे बियाणे निवडावे
 - ५) मुळांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी भु-सुधारकांचा उदा. थायोग्रिन, सिंगल सुपर फॉस्फेट, रूटांझा (मायकोरायझा) तसेच लिओनार (सुपर पोट्याशियम ह्युमेट) सारख्या खताचा चा वापर करावा
 - ६) बियाणे दाट पेरू नये
 - ७) बियाणे पेरतांना गादीवाफ्याचा वापर करावा
 - ८) गरजेनुसार बुरशीनाशक, किटकनाशक व रासायनिक खताचा फवारणी व्दारे किंवा ड्रेचिंग व्दारे वापर करावा
 - ९) वातावरणानुसार व दव/धुई आल्यास स्पर्शजन्य + आंतरप्रवाही बुरशीनाशकांचा आणि किटकनाशकांचा गरजेनुसार फवारा घेत रहावा.
- १०) रोप लागवडीच्या वेळी जर त्यावर वरिल कोलेटोट्रायकम ह्या बुरशीचा प्रादुर्भाव असेल तर त्या रोपाला लागवडीच्या आधी कार्बेडिझम - १ ग्रॅम + कॅप्टन किंवा एम-४५ - २ ग्रॅम अधिक कार्बोसल्फान - २.५ मिली प्रति लिटर पाणी च्या द्रावणात बुडवुन लागवड केल्यास खुप चांगला फायदा दिसुन येतो.



अधिक माहितीसाठी संपर्क : ९६०७९१०९४३ / ८३



अॅग्रि सर्च (इंडिया) प्रा.लिमिटेड
जेथे प्रत्येक संकल्पनेला शास्त्रीय आधार आहे

