

कोबी-फलावर अन्नद्रव्य व्यवस्थापन

... एक शास्त्रोक्त सल्ला ...



लागवडीनंतर बुडाजवळ खताची मात्रा लाऊन माती आड करावयाचा डोस (प्रति एकर)

- १०:२६:२६ किंवा १२:३२:१६ - २ बॅग
- + अॅम्पल-जी - १० किलो
- + थायोग्रिन - ३ किलो

फवारणीव्दारे अन्नद्रव्य व किड-रोग व्यवस्थापन (प्रति एकर १५ लि. पाणी)

कालावधी	उत्पादन	प्रमाण (१५ लि. पाणी)
लागवडीनंतर १० ते १५ दिवसांनी	१९:१९:१९ + अॅम्पल + किटकनाशक + ऑरसिल	३० ग्रॅम ३५ मिली गरजेनुसार ५ मिली
लागवडीनंतर २० ते २५ दिवसांनी	एक्सीड + १२:६१:०० + किटकनाशक / बुरशीनाशक + ऑरसिल	३० ग्रॅम ५० ग्रॅम गरजेनुसार ५ मिली
लागवडीनंतर ३० ते ३५ व ४० ते ४५ दिवसांनी (दोन वेळेस)	झिंकाबोर + कॅल्मिनो + मॅग्नेशियम सल्फेट + किटकनाशक / बुरशीनाशक + ऑरसिल	४० मिली ४० मिली ५० ग्रॅम गरजेनुसार ५ मिली
लागवडीनंतर ५० ते ५५ दिवसांनी	पॅशन + सिमिग्रो + किटकनाशक + ऑरसिल	५० ग्रॅम ४० मिली गरजेनुसार ५ मिली



अॅग्रि सर्च (इंडिया) प्रा.लिमिटेड

आय.एस.ओ. ९००१:२०१५ व १४००१:२०१५ प्रमाणित कंपनी

अधिक माहितीसाठी संपर्क

- * नाशिक - ९६०७९१०९८३
- * मराठवाडा - ९४२०२७०९४१
- * पश्चिम महाराष्ट्र - ९६०७९१०९५०/४५
- * खान्देश - ९१५८२७०७८९
- * नगर - ९६०७९१०९३८/३७
- * विदर्भ - ९४२२५४१४९३
- * सोलापूर - ९७६६६८२४९८

अॅग्रि सर्च, जेथे प्रत्येक संकल्पनेला शास्त्रीय आधार आहे