



# मिरची एकात्मिक अन्नद्रव्य व किड-रोग व्यवस्थापन



## बेसल डोस (लागवडीपूर्वी बेड मध्ये भरावयाचा डोस) प्रति एकर :

- चांगले कुजलेले शेतखत ८ ते १० टन किंवा
- + ओरिजीनो सेंद्रिय खत - १० ते २० बॅग (जमिनीच्या प्रकारानुसार)
- + डि.ए.पी. - १०० किलो किंवा सुपर फॉस्फेट - २०० किलो
- + एम.ओ.पी. - २५ किलो
- + रुटांझा - ४ किलो



## ड्रॅगिंगद्वारे खत व किड-रोग व्यवस्थापन (प्रति एकर)

- १) लागवडीनंतर २ ते ३ दिवसांनी  
कंसर्ट - १ लिटर  
+ ट्रायकोडर्मा - १ किलो  
+ प्रोबियोन - १ लिटर  
टिप : रुटांझा-Granular बेसल डोस मध्ये वापरले नसेल तर रुटांझा-WS १०० ग्रॅम प्रति एकर असे पहिल्या ड्रॅगिंगमध्ये वापरावे.
  - २) लागवडीनंतर ८ ते १० दिवसांनी  
१९:१९:१९ - २ किलो  
+ संचार-४० - ५०० मिली  
+ बाविस्टीन - २५० ग्रॅम + थायोमिथोक्झेम - १०० ग्रॅम
  - ३) लागवडीनंतर १५ दिवसांनी  
१२:६१:०० - ३ किलो  
+ लिओनार - ५०० ग्रॅम + लोहाड्रिप - ५०० ग्रॅम
  - ४) लागवडीनंतर २० दिवसांनी  
कॅल्शियम नायट्रेट - ३ किलो + झिलबोर - २५० ग्रॅम  
+ अॅग्रीप्लेक्स-ओए - ५०० मिली + १३:००:४५ - २ किलो
- टिप : वरिल कॉम्बिनेशन ३०० लिटर पाण्यात टाकुन प्रति झाड (रोप) ५० मिली अशी प्रति एकर ड्रॅगिंग करावी.

## ड्रिपद्वारे खत व्यवस्थापन (प्रति एकर)

- १) लागवडीनंतर २५ दिवसांनी ४५ ते ५० दिवसांनी आणि ७५ ते ८० दिवसांनी (तीन वेळेस)  
मिगल - २ किलो  
+ थायोप्रिन - २ किलो  
+ अनमोल मॅग्नेशियम सल्फेट - ८-१० किलो
- २) लागवडीनंतर ३० दिवसांच्या पुढे प्रत्येक आठवड्याला  
१२:६१:०० - ४ किलो  
+ ००:००:५० - ३ किलो
- ३) लागवडीनंतर ३५ दिवसांनी  
कॅल्शियम नायट्रेट - ८-१० किलो  
+ झिलबोर - २५० ग्रॅम + अॅग्रीप्लेक्स-ओए - १ लिटर
- ४) लागवडीनंतर ४०-४५ दिवसान दरम्यान  
कंसर्ट - १ लिटर  
+ ट्रायकोडर्मा - १ किलो  
+ प्रोबियोन - १ लिटर
- ५) मिरचीची लांबी, वजन, कलर व गुणवत्ता वाढवण्यासाठी  
पॅशन - ६ किलो  
+ सिमिग्रो - १ लिटर  
+ थायोप्रिन - २ किलो



क्र.	लागवडीनंतर	औषध	प्रमाण (प्रति २०० लिटर)	उद्देश
१)	१५ दिवसांनी	बेनेविया किंवा कॉन्फीडॉर + ॲम्पल + इनफ्युज	प्रमाणानुसार ४०० मिली + २०० मिली	रस शोषक किडीसाठी प्रतिबंधक
२)	२० दिवसांनी	एक्सीड + स्प्राऊट + १३:४०:१३ + ॲन्ट्राकॉल	२५० ग्रॅम २५० मिली ५०० ग्रॅम ४०० ग्रॅम	शाकीय वाढ होण्यासाठी
३)	२५ दिवसांनी	बेनेविया किंवा फिफ्रोनिल + इनफ्युज	प्रमाणानुसार २०० मिली	रस शोषक किडीसाठी प्रतिबंधक
४)	३० दिवसांनी	झिंकाबोर + कॅलमिनो + अनमोल मॅग्नेशियम सल्फेट + साफ	५०० मिली ५०० मिली ५०० ग्रॅम ५०० ग्रॅम	फुलधारणा व फळधारणा व्यवस्थित होण्यासाठी प्रतिबंधक
५)	३५ दिवसांनी	लुना किंवा ॲक्रिसीओ + इनफ्युज	प्रमाणानुसार २०० मिली	भुरी व करप्यासाठी प्रतिबंधक
६)	४० दिवसांनी	एक्सीड + व्हॅटिला किंवा होमन + ००:५२:३४ + प्रोक्लेम	२५० ग्रॅम २५० मिली ५०० ग्रॅम १०० ग्रॅम	जोमदार फुलधारणा व फळधारणा होण्यासाठी
७)	४५ दिवसांनी	झिंकाबोर + कॅलमिनो + अनमोल मॅग्नेशियम सल्फेट + सिस्थेन किंवा इंडेक्स	५०० मिली ५०० मिली ५०० ग्रॅम १०० ग्रॅम	फुलगळ होऊ नये म्हणुन व भुरीसाठी प्रतिबंधक
८)	भुरी दिसत असल्यास	मिनोरा + मेलकॉन सुपर	१ लि. + २५० मिली	गरजेनुसार
९)	५० ते ५५ दिवसांनी	संचार + मेटालॅक्झील + मॅन्कोझेब + सिमिग्रो + अबामेक्टीन	५०० मिली ५०० ग्रॅम ५०० मिली १०० मिली	बुरशीनाशक व किटकनाशक
१०)	६० ते ६५ दिवसांनी	के२-व्हायब्रंट + स्कोर + कुमान-एल + ००:५२:३४ + सिलवॉल	२०० ग्रॅम १०० मिली + ५०० मिली ५०० ग्रॅम २०० ग्रॅम	झाडाची प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी
११)	७० ते ७५ दिवसांनी	झिंकाबोर + कॅलमिनो + अनमोल मॅग्नेशियम सल्फेट + रोको + रिजेन्ट	५०० मिली ५०० मिली ५०० ग्रॅम २५० ग्रॅम २५० मिली	फुलधारणा व फळधारणा व्यवस्थित होत राहण्यासाठी व बुरशीनाशक-किटकनाशक म्हणुन
१२)	८० ते ९० दिवसांनी	संचार-४० + कझॅट + किटकनाशक + इनफ्युज	५०० मिली ५०० ग्रॅम गरजेनुसार + २०० मिली	बुरशीनाशक व किटकनाशक

टिप : वरिल फवारणी शेड्युल ३ महिन्या पर्यंत देण्याचा प्रयत्न केला आहे, ते झाल्यानंतर वरिल फवारणीचे शेड्युल लागवडीनंतर ४० दिवसांच्या फवारणीपासुन पुन्हा सुरु करावे. \* शेड्युल एक आरसा म्हणुन दिलेले आहे, त्यामध्ये परिस्थितीनुसुत बदल होऊ शकतात.

नाशिक : ९६०७९१०९८३ | खान्देश : ९६०७९१०९०९/२४ | मराठवाडा : ९६०७९१०९६३

नगर : ९६०७९१०९३८/३७ | प.महाराष्ट्र : ९६०७९१०९४६/८१४९५३८१२५ | विदर्भ : ९४२२५४१४९३



ॲग्रि सर्च (इंडिया) प्रा.लिमिटेड, जेथे प्रत्येक संकल्पनेला शास्त्रीय आधार आहे

