



वांगी एकात्मिक अन्नद्रव्य व किड-रोग व्यवस्थापन



बेसल डोस (लागवडीपूर्वी बेड मध्ये भरावयाचा डोस) प्रति एकर :

- चांगले कुजलेले शेतखत ८ ते १० टन किंवा
- + ओरिजीनो सेंद्रिय खत - १० ते २० बॅग (जमिनीच्या प्रकारानुसार)
- + डि.ए.पी. - १०० किलो किंवा सुपर फॉस्फेट - २०० किलो
- + एम.ओ.पी. - २५ किलो
- + रूटांझा - ४ किलो

ड्रिपिंगव्दारे खत व किड-रोग व्यवस्थापन (प्रति एकर किमान ४०० लिटर पाणी)

- लागवडीनंतर २ ते ३ दिवसांनी
कंसर्ट - २ लिटर
+ बायोरिदम - २५० ग्रॅम किंवा ट्रायकोडर्मा - प्रमाणानुसार
+ प्रोबियॉन - १ लिटर
} मर / डंपिंग होऊ नये म्हणून प्रतिबंधक उपाय
- लागवडीनंतर ८ ते १० दिवसांनी
१९:१९:१९ - ३ किलो
+ लिओनार - २५० ग्रॅम
+ थायोमिथोक्झेम किंवा इमिडाक्लोप्रिड + फिफ्रोनिल - १०० ग्रॅम
} पांढऱ्या मुळीची व्यवस्थित वाढ होऊन रोप लवकर सेट होण्यासाठी व रस शोषक किडीसाठी प्रतिबंधक उपाय
- लागवडीनंतर १५ दिवसांनी
अॅग्रिप्लेक्स-ओए - १ लिटर
+ १३:४०:१३ - ३ किलो
+ लोहाड्रिप - ५०० ग्रॅम
} जोमदार फुटवे निघण्यासाठी

ड्रिपव्दारे खत व्यवस्थापन (प्रति एकर)

- लागवडीनंतर २० दिवसांनी ४५ ते ५० दिवसांनी आणि ७५ ते ८० दिवसांनी (तीन वेळेस)
मिंगल - २ किलो
+ थायोप्रिन - २ किलो
+ अनमोल मॅग्नेशियम सल्फेट - ८-१० किलो
} ह्या कॉम्बिनेशनचा वापर दर महिन्यातून एकदा करत रहावा.
- लागवडीनंतर २५ दिवसांच्या पुढे प्रत्येक आठवड्याला
१२:६१:०० - ४ किलो
+ ००:००:५० - ३ किलो
+ अॅग्रिप्लेक्स-ओए - १ लिटर
} एन.पी.के. पुरवण्यासाठी व अन्नद्रव्य उपलब्धतेसाठी दर आठवड्याला वरील कॉम्बिनेशन देत रहावे.
- लागवडीनंतर ३० दिवसांनी
कॅल्शियम नायट्रेट - ८-१० किलो
+ झिलबोर - २५० ग्रॅम
} दर महिन्याला म्हणजे लागवडीनंतर ३०, ६०, ९०, १२० दिवसांनी देत रहावे.
- मिरचीची लांबी, वजन, कलर व गुणवत्ता वाढवण्यासाठी
पॅशन - ६ किलो
+ सिमिग्रो - १ लिटर
+ प्रोबियॉन - १ लिटर
} हे कॉम्बिनेशन गरजेनुसार २ ते ३ मिरचीच्या खुड्यांनंतर देत रहावे.
- लागवडीनंतर ४०-४५ दिवसान दरम्यान
कंसर्ट - २ लिटर
+ बायोरिदम - २५० ग्रॅम किंवा ट्रायकोडर्मा - प्रमाणानुसार
+ प्रोबियॉन - १ लिटर
} स्लरी-मर येऊ नये म्हणून प्रतिबंधक उपाय



फवारणीद्वारे अन्नद्रव्य व किड-रोग व्यवस्थापण

क्र.	लागवडीनंतर	औषध	प्रमाण (प्रति लिटर)	उद्देश
१)	१५ दिवसांनी	बेनेविया / थायोमिथोझेम	प्रमाणानुसार	रस शोषक किडींसाठी प्रतिबंधक
२)	२० दिवसांनी	एक्सीड + स्प्राऊट + १३:४०:१३ + कोळीनाशक	१.२५ ग्रॅम १.२५ मिली २.५ ग्रॅम गरजेनुसार	शाकीय वाढ होण्यासाठी
३)	२५ दिवसांनी	बेनेविया / फिफ्रोनिल	प्रमाणानुसार	रस शोषक किडींसाठी प्रतिबंधक
४)	३० दिवसांनी	कॅलमिनो + झिंकाबोर + अनमोल मॅग्नेशियम सल्फेट + १२:६१:००	०.५ ग्रॅम २.५ मिली २.५ ग्रॅम ०.५ ग्रॅम	फुलधारणा व फळधारणा व्यवस्थित होण्यासाठी प्रतिबंधक
५)	३५ दिवसांनी	लुना / अॅक्रिसीओ + इन्फुज	प्रमाणानुसार १ मिली	भुरी व करप्यासाठी प्रतिबंधक
६)	४० दिवसांनी	व्हॅटिला + ००:५२:३४ + झिलबोर + इव्हान्स + अॅम्पलीगो	१.२५ मिली २.५ ग्रॅम ०.५ ग्रॅम २ मिली + प्रमाणानुसार	जोमदार फुलधारणा व फळधारणा होण्यासाठी किटकनाशक
७)	४५ दिवसांनी	कॅलमिनो + झिंकाबोर + अनमोल मॅग्नेशियम सल्फेट + सिस्थेन / इंडेक्स	०.५ ग्रॅम २.५ मिली २.५ ग्रॅम ०.५ ग्रॅम	फुलगळ होऊ नये म्हणुन व भुरीसाठी प्रतिबंधक
८)	भुरी दिसत असल्यास	मिनोरा + मेलकॉन सुपर	५ मिली + १.२५ मिली	गरजेनुसार
९)	५० ते ५५ दिवसांनी	संचार + मेटालॅक्झील + मॅन्कोझेब + प्रोकलेम + इन्फुज	२.५ मिली २.५ ग्रॅम प्रमाणानुसार १ मिली	बुरशीनाशक व किटकनाशक
१०)	६० ते ६५ दिवसांनी	एक्सीड + अॅम्पल किंवा प्रोबियाँन + १३:४०:१३ किंवा ००:५२:३४ + सिलवॉल + अॅम्पलीगो	१.५ ग्रॅम २.५ मिली ३ ग्रॅम १ ग्रॅम + प्रमाणानुसार	झाडाची प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी व किटकनाशक
११)	७० ते ७५ दिवसांनी	झिंकाबोर + कॅलमिनो + अनमोल मॅग्नेशियम सल्फेट + मेलकॉन सुपर + कार्बोसल्फान	२.५ मिली ०.५ ग्रॅम २.५ ग्रॅम १.२५ मिली प्रमाणानुसार	फुलधारणा व फळधारणा व्यवस्थित होत राहण्यासाठी व बुरशीनाशक-किटकनाशक म्हणुन
१२)	८० ते ९० दिवसांनी	संचार-४० + कझॅट + डेलिगेट + इन्फुज	२.५ मिली ३ ग्रॅम प्रमाणानुसार १ मिली	बुरशीनाशक व किटकनाशक

टिप : वरिल फवारणी शेड्युल ३ महिन्या पर्यंत देण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यामध्ये परिस्थितीनुसार बदल करून घ्यावा.



अॅग्रि सर्च (इंडिया) प्रा.लिमिटेड

आय.एस.ओ. ९००१:२०१५ व १४००१:२०१५ प्रमाणित कंपनी

अधिक माहितीसाठी संपर्क

गोरख भिसे - ९४२३०१२७५९