



## सोयाबिन पिकाच्या भरघोस उत्पादनासाठी अन्नद्रव्य व्यवस्थापन

••• एक शास्त्रोक्त सल्ला •••

### बेसल डोस (प्रति एकर)

\* सोयाबिन लागवडीच्या किंवा पेरणीच्या वेळी खालील डोस घ्यावा.

१०:२६:२६ किंवा १२:३२:१६ : २ बॅग

+ ॲम्पल-जी : १० किलो किंवा रूटांझा : ४ किलो

+ थायोग्रिन : ३ ते ६ किलो

### फवारणीद्वारे अन्नद्रव्य व किड-रोग व्यवस्थापन

कालावधी	उत्पादन	प्रमाण (१५ लि. पाणी)	उद्देश
पेरणीनंतर तणनाशक फवारतांना	झिंकाबोर + तणनाशक	७५ मिली प्रमाणानुसार	तणनाशकाचा शॉक बसुनये म्हणुन तण नियंत्रणासाठी
पेरणीनंतर २० ते २५ दिवसांनी (वाढीची अवस्था)	एक्सीड + रिलिज फेरस + १२:६१:०० + बुरशीनाशक/किटकनाशक	३० ग्रॅम १५ ग्रॅम ४० ग्रॅम प्रमाणानुसार	सोयाबिन पिवळेपणाच्या व्यवस्थापनासाठी (क्लोरोसीस) प्रतिबंधक उपाय
पेरणीनंतर ३५ ते ४० दिवसांनी (फुलधारणा - फळधारणा अवस्था)	के२-व्हायब्रंट (सोयाबिन स्पेशल) + मॅग्नेशियम सल्फेट + १३:४०:१३ + बुरशीनाशक/किटकनाशक	१५ ग्रॅम ४० ग्रॅम ५० ग्रॅम प्रमाणानुसार	सोयाबिन पिवळेपणाच्या व्यवस्थापनासाठी व भरघोस फुलधारणा व फळधारणा होण्यासाठी
पेरणीनंतर ५० ते ६० दिवसांनी (दाणे भरण्याची अवस्था)	झिबॉम + वॅटीला + पॅशन + किटकनाशक	७५ मिली २० मिली ५० ग्रॅम प्रमाणानुसार	सोयाबिनमध्ये तेलाची गुणवत्ता व प्रमाण वाढवुन उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी



**ॲग्री सर्च (इंडिया) प्रा.लिमिटेड**

आय.एस.ओ. ९००१:२०१५ व १४००१:२०१५ प्रमाणित कंपनी

#### अधिक माहितीसाठी संपर्क

* नाशिक	- ९६०७९१०९८३	* खान्देश	- ९१५८२७०७८९
* मराठवाडा	- ९४२०२७०९४१	* नगर	- ९६०७९१०९३८/३७
* पश्चिम महाराष्ट्र	- ९६०७९१०९५०/४५	* विदर्भ	- ९४२२५४१४९३
		* सोलापूर	- ९७६६६८२४९८